



EL42-Inhibitor®

Complément alimentaire à visée antinéoplasique d'origine végétale



Forme pharmaceutique

Gélules conditionnées en boîtes de 60 ou 120 unités. Chaque gélule contient un mélange d'extraits de plantes standardisées et de farine de riz comme agent de charge.



Classe thérapeutique

Antinéoplasique d'origine naturelle agissant par inhibition de la synthèse protéique ribosomale, développé selon les principes de la phytothérapie moderne.



Indications

Adjuvant dans la prise en charge des proliférations cellulaires anormales et dans les approches intégratives des pathologies tumorales.



AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHÉ
APPROVED FOR SALE
NUMÉRO D'AUTORISATION

Composition qualitative et quantitative

EL42-Inhibitor® associe quatre extraits végétaux soigneusement sélectionnés pour leurs propriétés complémentaires dans la modulation de la prolifération cellulaire. Chaque gélule contient une formulation synergique d'extraits secs standardisés issus de plantes médicinales reconnues pour leur activité biologique au niveau cellulaire et ribosomal.

Galega officinalis

Extrait sec standardisé présentant des propriétés antinéoplasiques par inhibition de la synthèse protéique au niveau ribosomal.

Ageratum conyzoides

Extrait sec contribuant à la modulation de la prolifération cellulaire et au renforcement de l'activité antinéoplasique globale.

Carica papaya

Extrait de feuilles agissant sur la régulation des processus inflammatoires et assurant la protection des tissus sains.

Ipomoea sp

Extrait végétal contribuant à l'équilibre immunitaire général et à l'harmonisation de la réponse physiologique.

Posologie et mode d'emploi

Adulte : Prendre 2 gélules par jour (matin et soir), de préférence après les repas, avec un grand verre d'eau. La posologie peut être ajustée par un professionnel de santé qualifié en fonction du protocole thérapeutique global et des besoins individuels du patient.

L'administration régulière selon le schéma posologique recommandé permet d'optimiser l'efficacité du produit dans le cadre d'une stratégie thérapeutique intégrative.

Conservation

Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière directe. La durée de péremption est clairement indiquée sur le flacon. Après ouverture, bien refermer le contenant pour préserver l'intégrité du produit.

Informations de sécurité et propriétés pharmacologiques

Contre-indications et précautions d'emploi



Contre-indications

Aucune contre-indication n'a été identifiée à ce jour dans les conditions normales d'utilisation du produit. Les données actuelles ne révèlent pas de situation clinique interdisant formellement l'administration d'EL42-Inhibitor®.



Précautions générales

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Informer systématiquement le médecin traitant en cas d'association à un traitement anticancéreux ou immunomodulateur.



Grossesse et allaitement

L'utilisation peut être envisagée pendant la grossesse et l'allaitement sous contrôle médical strict et uniquement en cas de nécessité thérapeutique clairement justifiée par le praticien.

Interactions médicamenteuses

Aucune interaction médicamenteuse n'a été documentée ou rapportée à ce jour dans la littérature scientifique disponible. Néanmoins, par mesure de précaution et dans une démarche de sécurité optimale, il est fortement recommandé d'informer le médecin traitant de toute prise concomitante avec un traitement anticancéreux conventionnel ou un agent immunomodulateur.

Cette communication permet d'assurer une surveillance appropriée et une coordination thérapeutique efficace dans le cadre d'une prise en charge intégrative.

Effets indésirables

Le profil de tolérance d'EL42-Inhibitor® apparaît excellent dans les conditions normales d'utilisation. Aucun effet indésirable significatif n'a été rapporté lors des utilisations documentées.

Dans de rares cas, une légère fatigue transitoire ou des troubles digestifs mineurs peuvent survenir au début du traitement, s'atténuant généralement spontanément après quelques jours d'adaptation physiologique.

Propriétés pharmacologiques

EL42-Inhibitor® exerce son activité antinéoplasique par un mécanisme d'action ciblé au niveau cellulaire. Les principes actifs contenus dans les extraits de *Galega officinalis* et d'*Ageratum conyzoides* interfèrent spécifiquement avec la synthèse protéique au niveau ribosomal, induisant ainsi une modulation de la prolifération cellulaire pathologique.

L'extrait de *Carica papaya* complète cette action principale en régulant les processus inflammatoires associés et en assurant une protection des tissus sains environnants, tandis que l'extrait d'*Ipomoea* sp contribue à maintenir l'équilibre immunitaire général et à optimiser la réponse physiologique globale de l'organisme.

 Cette synergie phytochimique permet une approche intégrative respectueuse des mécanismes physiologiques naturels, tout en ciblant efficacement les dysfonctionnements cellulaires pathologiques.

Informations administratives



Fabricant / Distributeur
Laboratoires TBC

66 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris, France



Contact

Téléphone : (+33) 9 72 65 00 89
Email : info@laboratoires-tbc.com
Site web : www.etobiotech.com