



Polyarthrosine®

Complément Naturel pour la Santé Articulaire

Polyarthrosine® représente une avancée significative dans la prise en charge naturelle des troubles inflammatoires articulaires. Cette formulation innovante associe trois extraits de plantes soigneusement sélectionnés pour leurs propriétés complémentaires en matière de soutien articulaire et de réduction des inflammations rhumatismales.

Présentation du Produit

Gélules de 550 mg disponibles en boîtes de 30 ou 60 unités. Chaque gélule contient une combinaison optimisée d'extraits végétaux standardisés, garantissant une qualité constante et une efficacité reproductible. Le poids net total d'une boîte est d'environ 33 grammes, facilitant le dosage et l'observance thérapeutique.

La forme galénique en gélules assure une libération progressive des principes actifs et une excellente biodisponibilité des composés végétaux. L'excipient à base de farine de riz contribue à la stabilité de la formulation tout en restant parfaitement toléré.




Composition Qualitative

- **Nauclea latifolia** (racine) : 200 mg d'extrait sec par gélule
- **Anogeissus leiocarpa DC.** (écorce) : 200 mg d'extrait sec
- **Persea americana Mill.** (fruit) : 350 mg d'extrait sec
- Excipient : farine de riz (quantité suffisante)

Cette synergie végétale a été développée selon les standards pharmaceutiques les plus exigeants, garantissant traçabilité et sécurité d'emploi.

Polyarthrite
Réduction de l'inflammation multi-articulaire et amélioration de la mobilité quotidienne



Spondylarthrite

Soulagement des raideurs rachidiennes et maintien de la flexibilité vertébrale

Rhumatismes

Atténuation des douleurs inflammatoires et protection du cartilage articulaire

Mécanisme d'Action Synergique

L'efficacité de Polyarthrosine® repose sur une action multi-cibles parfaitement orchestrée. Le **Nauclea latifolia** exerce une activité analgésique et anti-inflammatoire démontrée, agissant directement sur les médiateurs de la douleur articulaire. Cette plante, utilisée traditionnellement en phytothérapie africaine, a fait l'objet de nombreuses études pharmacologiques confirmant son potentiel thérapeutique dans les affections rhumatismales.

L'**Anogeissus leiocarpa**, particulièrement riche en tanins condensés et en flavonoïdes, contribue à moduler la réponse inflammatoire en inhibant les cytokines pro-inflammatoires. Au-delà de son action anti-inflammatoire, cet extrait favorise activement la régénération du tissu cartilagineux, offrant ainsi une protection structurelle aux articulations sollicitées. Les polyphénols présents exercent également un effet antioxydant protecteur contre le stress oxydatif articulaire.

Le **Persea americana** (avocat) complète cette synergie par ses propriétés lubrifiantes et chondroprotectrices. Les insaponifiables d'avocat stimulent la synthèse de collagène et de protéoglycanes, composants essentiels de la matrice cartilagineuse. Cette action trophique sur le cartilage permet de ralentir la dégradation articulaire tout en améliorant la souplesse et la résistance des tissus conjonctifs.

Le **Persea americana** (avocat) complète cette synergie par ses propriétés lubrifiantes et chondroprotectrices. Les insaponifiables d'avocat stimulent la synthèse de collagène et de protéoglycanes, composants essentiels de la matrice cartilagineuse. Cette action trophique sur le cartilage permet de ralentir la dégradation articulaire tout en améliorant la souplesse et la résistance des tissus conjonctifs.


L'association de ces trois extraits produit un effet synergique supérieur à la somme de leurs actions individuelles. Cette complémentarité d'action permet une prise en charge globale : réduction de l'inflammation, soulagement de la douleur, protection du cartilage et amélioration de la fonction articulaire. L'approche multi-cibles offre ainsi une alternative naturelle intéressante dans la gestion au long cours des pathologies inflammatoires articulaires.

Modalités d'Utilisation et Informations Pratiques



Phase de Crise Inflammatoire

Administration de 6 gélules maximum par jour réparties en 3 prises (2 gélules le matin, 2 à midi, 2 le soir), à prendre avant les repas, 1 jour sur 2. Cette posologie adaptée permet une gestion optimale des épisodes aigus.



Traitement d'Entretien

2 gélules par jour après le repas principal, ou alternativement 2 gélules tous les 2 jours selon l'évolution clinique. À avaler avec un grand verre d'eau pour faciliter le passage œsophagien et optimiser l'absorption.



Population Cible

Réservé exclusivement aux adultes. L'utilisation pédiatrique n'est pas documentée et reste contre-indiquée en l'absence de données de sécurité spécifiques.

Contre-Indications et Précautions d'Emploi

Polyarthrosine présente un profil de sécurité favorable dans les conditions d'utilisation recommandées. Néanmoins, certaines précautions doivent être scrupuleusement respectées pour garantir une utilisation optimale et sécurisée du produit.

Contre-indications absolues : Le produit est formellement contre-indiqué en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants de la formulation. Il est également déconseillé chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes ou allaitantes, en l'absence de données cliniques suffisantes dans ces populations particulières.

Interactions médicamenteuses : Bien qu'aucune interaction médicamenteuse significative n'ait été rapportée à ce jour, il est fortement recommandé de ne pas associer Polyarthrosine® à d'autres anti-inflammatoires, qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique, sans avis médical préalable. Cette précaution vise à prévenir tout risque de potentialisation des effets indésirables.

Mises en Garde Importantes

- Ne jamais dépasser les doses recommandées
- Tenir hors de portée des enfants
- Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- S'inscrit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée
- Ne se substitue pas à un traitement médical conventionnel sans avis spécialisé

Tolérance et Effets Indésirables

Le profil de tolérance de Polyarthrosine® est excellent aux doses thérapeutiques recommandées. Aucun effet indésirable majeur n'a été documenté lors des utilisations conformes au protocole posologique. Dans de rares cas, des troubles digestifs bénins et transitoires peuvent survenir en début de traitement, généralement résolutifs spontanément sans nécessiter l'arrêt de la supplémentation. Ces manifestations mineures peuvent être minimisées en prenant les gélules au cours des repas.

Conservation et Stabilité

Durée de conservation : 36 mois à partir de la date de fabrication dans les conditions appropriées. Conserver à température ambiante (15-25°C), dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe. La date de péremption est clairement indiquée sous le pilulier.

Informations Administratives

Laboratoires TBC66 Avenue des Champs-ÉlyséesF-75008 Paris, France,
Email : info@laboratoires-tbc.com / www.etobiotech.com

Recommandations Professionnelles

Polyarthrosine® s'intègre parfaitement dans une stratégie thérapeutique globale de prise en charge des pathologies rhumatismales chroniques. Son utilisation doit s'accompagner de mesures hygiéno-diététiques appropriées incluant une activité physique adaptée, le maintien d'un poids corporel optimal et une alimentation anti-inflammatoire riche en acides gras oméga-3. L'approche multimodale associant phytothérapie, modifications du mode de vie et, si nécessaire, traitements conventionnels, offre les meilleures perspectives d'amélioration fonctionnelle et de qualité de vie pour les patients souffrant d'affections articulaires inflammatoires chroniques.